

# Ciclaminò

## *Cyclamen hederifolium*

**Divisione:** *Spermatophyta*  
**Sottodivisione:** *Angiospermae*  
**Classe:** *Dicotyledones*  
**Sottoclasse:** *Sympetalae*  
**Ordine:** *Primulales*  
**Famiglia:** *Primulaceae*  
**Genere:** *Cyclamen*  
**Specie:** *C. hederifolium*

**ASPETTO:** specie erbacea perenne, provvista di un grande tubero globoso e un po' schiacciato, con radici soltanto nella porzione superiore.

**FIORI:** unico formato da tre petali ricurvi sui sepali che rimangono all'interno della corolla; di colore rosa-fucsia a seconda delle quote altimetriche. Sono sorretti da lunghi peduncoli, inodori, con macchie porporine scure alla base. Le lacinie della corolla, sono ripiegate all'indietro ed hanno alla base delle orecchiette sporgenti. Lo stilo supera di poco il tubo della corolla. Il peduncolo del frutto si ripiega verso il basso attorcigliandosi a spirale.

**FRUTTO:** capsula deiscente.

**FOGLIE:** compaiono alla fine dell'estate e nell'autunno, dopo i fiori. Si dipartono dal bulbo appiattito, sono cuoriformi, lungamente pic-

ciolate, maculate d'argento, rosso porpora nel lato inferiore. Sono cordato-ovate, bislunghe, lobate o angolose con il margine irregolarmente dentato.

### UBICAZIONE:

in terreni freschi, in ombra, nel sottobosco, in prati fioriti forma sovente densi popolamenti costituiti da numerosissimi individui.

**ALTEZZA:** 5-15 cm

**UTILIZZO IN GIARDINO:** è possibile anche la semina in terriccio sabbioso (le piante fioriranno al terzo anno dalla semina). In ciotole, come bordura o in prati fioriti.

**PROPAGAZIONE:** bulbo, seme.

*Il tubero è velenoso per l'uomo ma non per i maiali che lo mangiano tostato: per questo vien chiamato anche "pan porcino". È una pianta protetta.*



LE GUIDE  
**Agri**